

KOPFSCHMERZEN?

Zelldolor

Die natürliche Hilfe

NEU



Die Anwendungsgebiete leiten sich aus den Erfahrungen der Biochemie nach Dr. Schüssler ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Zur Milderung von Kopfschmerzen verschiedenen Ursprungs, wie

- ▶ Migräne (pulsierende, hämmernde oder pochende Kopfschmerzen)
- ▶ Spannungskopfschmerz (drückende, dumpfe oder ziehende Kopfschmerzen)
- ▶ Clusterkopfschmerz (brennende, stechende oder bohrende Kopfschmerzen)
- ▶ Kopfschmerz bei Jugendlichen (Schulkopfschmerz)
- ▶ Kopfschmerz nach übermäßigem Alkoholkonsum (Katerkopfschmerz)

Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt und Apotheker.

Wann wird Zeldolor eingesetzt?

KOPFSCHMERZEN

- ▶ Migräne ist durch einen periodisch wiederkehrenden, anfallartigen, pulsierenden, hämmernden oder pochenden halbseitigen Kopfschmerz, gekennzeichnet.
- ▶ Spannungskopfschmerzen sind die häufigste Form von Kopfschmerzen und äußern sich meist als ein drückender oder ziehender Schmerz, der beidseitig am Kopf im Bereich der Stirn auftritt.
- ▶ Clusterkopfschmerzen sind eine besonders intensive und einseitige Form von Kopfschmerzen, die in wiederkehrenden Episoden, sogenannten Clustern, auftreten.
- ▶ Kopfschmerz bei Jugendlichen (Schulkopfschmerz): Hierbei handelt es sich um wiederkehrende Kopfschmerzen bei Jugendlichen, die in direktem Zusammenhang mit der Schule stehen. Ursachen können Stress, Leistungsdruck, zu lange Bildschirmzeit, Schlafmangel oder falsche Ernährung sein.
- ▶ Kopfschmerz nach übermäßigem Alkoholkonsum: Der Katerkopfschmerz ist ein aktueller Kopfschmerz und entsteht durch Alkoholkonsum.



Die enthaltenen Mineralstoffe:

Nr. 2 Calcium phosphoricum D6

Nr. 3 Ferrum phosphoricum D12

Nr. 7 Magnesium phosphoricum D6

Nr. 8 Natrium chloratum D6

Nr. 10 Natrium sulfuricum D6

Nr. 19 Cuprum arsenicosum D12

Einnahme von Zeldolor:

Zum Einnehmen. Die Tabletten im Mund zergehen lassen.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

DOSIERUNG:

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Bei akuten Beschwerden:

Alle 5 Minuten 1 Tablette im Mund zergehen lassen.

Bei chronischen Beschwerden:

Stündlich 2 Tabletten im Mund zergehen lassen.

Kinder ab 6 Jahren:

Akute Beschwerden:

Alle 5 Minuten 1 Tablette im Mund zergehen lassen.

Chronische Beschwerden:

Stündlich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.